

משרד המבחן
22-1-1980
השפרייז



רשומות



1

קובץ התקנות

18 בינואר 1980

4079

כ"ט בטבת תש"ם

צמוד

785

תקנות שירות בטחון (תיקון), תש"ם—1980

תקנות שירות בטחון (תיקון), תש"ם-1980

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-15 לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב]¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום התוספת הראשונה והתוספת השניה לתקנות שירות בטחון, תשכ"ז-1967², החלפת התוספות הראשונה והשניה יבוא:

"תוספת ראשונה"

(תקנה 6)

המבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשיר לשירות

נבדק שיש בו לפחות אחד מהמבחנים המפורטים להלן הוא בלתי כשיר לשירות. ואלה המבחנים:

מבנה הגוף

1. גברים: קומה נמוכה מ-1.36 מ'; נשים: קומה נמוכה מ-1.31 מ'.
2. משקל מתחת למינימלי מעל גיל 21, כאמור בטבלה שלהלן.
3. משקל מעל למכסימלי מעל גיל 21, כאמור בטבלה שלהלן.

ט ב ל ה

משקל מינימלי (ק"ג)	משקל מכסימלי (ק"ג)	גובה (ס"מ)
70	36	140
75	37	145
80	38	150
86	39	155
92	41	160
98	43	165
104	45	170
110	48	175
116	52	180
122	56	185
128	59	190
134	61	195
140	65	200

הערות :

- (1) לגבי נבדקים שריריים במיוחד - יש להעלות את המשקל המכסימלי ב-10%.
- (2) מעל גובה 2 מ' - לבדיקה אצל רופא מומחה.

1 ס"ח תשי"ט, עמ' 286.

2 ק"ת תשכ"ז, עמ' 3399.

מחלות פנימיות ואורולוגיות

4. מחלות של קשריות וכלי לימפה

- א. T.B. lymphadenopathy. פעילה מעל שנתיים או ללא סיכויים לריפוי.
- ב. (1) פיילת Elephantiasis.
- (2) לימפאדמה מתקדמת עם הפרעות קשות בתנועות, או שינויים קשים בעור, או כיבים שאינם נרפאים.
- ג. Hodgkin's disease. malignant lymphoma.

5. מחלות של בלוטות הפרשה פנימיות

- א. זפק בעל ממדים גדולים עם הפרעות ניכרות שלא ניתן לניתוח.
- ב. פעילות יתר של בלוטת התריס עם הפרעות ניכרות מעל שנתיים או malignant exophthalmus.
- ג. myxedema, hypothyroidism שאינו מגיב לטיפול. cretinism. Hashimoto's disease.
- ד. acromegalia בצורה בולטת או מתקדמת.
- ה. pluriglandular insufficiency (Simmond's cachexia).
- ו. (1) פעילות יתר של הטוחה (hyperadrenalism) בצורה קשה ולא מגיבה לטיפול. (2) Cushing's syndrome בצורה קשה.
- (3) hyperaldosteronism שאינו מגיב לטיפול.
- (4) adrenogenital syndrome בצורה קשה.
- ז. diabetes insipidus עם הפרעות קשות.
- ח. Addison's disease.
- ט. hyperparathyroidism; hypoparathyroidism אשר אינם מגיבים לטיפול.
- י. היפוגונדיזם עם הפרעות קשות שאינן ניתנות לריפוי.

6. סכרת ו-cystic fibrosis

- א. (1) סכרת שהתגלתה לפני גיל 26 (למעט סכרת סמויה).
- (2) סכרת הזקוקה לטיפול בוריקות.
- (3) סכרת עם שינויים בעיניים, כליות, כלי דם היקפיים וכו'.
- ב. cystic fibrosis עם אשפוזים חוזרים עקב זיהומים או הפרעות בספיגה במערכת העיכול או עם הגבלה ניכרת בהתפתחות.

7. מחלות השיגרון, שיגרון ומחלות קולגן

- א. gout עם הפרעות ניכרות בתנועה ו/או סיבוכים כליתיים או אחרים.
- ב. rheumatoid arthritis בצורה קשה ומגבילה.

ג. F.M.F. עם התקפים תכופים למעלה משנה או ארתריטיס ממושכת או עמילואידוזיס.

ד. (1) systemic lupus erythematosus.

(2) periarteritis nodosa.

(3) מחלות קולגן סיסטמיות אחרות או וסקוליטיס סיסטמית כרונית.

8. מחלות דם

א. פגם מולד בכדוריות האדומות עם חוסר דם קבוע בינוני או קשה שלא ניתן לטיפול ע"י כריתת טחול או שלא תוקן ע"י כריתת טחול.

ב. תמס דם נרכש עם חוסר דם קבוע בינוני עד קשה.

ג. חוסר דם אפלסטי או סידרובלסטי ללא תגובה לטיפול במשך שנה.

ד. חוסר דם קבוע על רקע מצבי חוסר שאינו ניתן לטיפול.

ה. מחלות דמם תורשתיות עם תופעות דמם עצמוניות.

ו. פורפורה טרומבוציטופנית כרונית עם תופעות דמם קבועות וללא תגובה לטיפול.

ז. (1) לאוקמיה על כל צורותיה.

(2) מיאלופיברוזיס.

ח. multiple myeloma. מאקרולובולינמיה. אגמהגלובולינמיה וכל דיספרוטאינמיה עם ביטוי קליני.

ט. אגרנולוציטוזיס חוזרת.

י. פוליציטמיה ורה סימפטומטית.

9. מחלות הסימפונות והריאות

א. (1) chronic emphysema of lungs עם השפעה על פעולת הלב והריאות.

(2) chronic bronchitis and cor pulmonale.

ב. אסטמה עם התקפים תכופים וקשים מלווים שינויים בריאות ובלב.

ג. שינויים ברונכיאקטטיים ביותר מאונה אחת עם תופעות קליניות קשות ו/או ללא סיכויים לריפוי.

ד. אכינקוקוס של שתי ריאות או של ריאה אחת, שאינו ניתן לריפוי.

ה. גוף זר בריאות או בסימפון עם הפרעות קשות ותכופות אשר אינן ניתנות לריפוי.

ו. מצב לאחר מחלה, פציעה או ניתוח בריאות או מחלה כללית עם סיכויים ו/או הגבלה ניכרת בתיפקוד הריאות.

ז. היפופלזיה של הריאות עם אנמנזה של זיהומים חוזרים או דימומים בדרכי הנשימה, או ציסטות דר-צדדיות של הריאות.

ח. (1) שחפת ריאות ממושטת או שחפת שהתרפאה עם שינויים בולטים ברקמות או עם הפרעה פונקציונלית רצינית או מצב לאחר כריתת ריאה.

(2) שחפת ריאות פעילה מעל שנתיים.

ט. מצב לאחר פלורייטיס שחפתית שהתרפאה עם הידבקות נרחבות של קרום הריאה, עם הפרעות ניכרות. שחפת פעילה של קרום הריאה מעל שנתיים.

- י. (1) spontaneous pneumothorax חוזר מעל 3 פעמים אשר לא ניתן לריפוי.
(2) הידבקות נרחבות דו-צדדיות לאחר דלקת קרום הריאה לא שחפתית עם הפרעות ניכרות.

10. מחלות ומומי לב –

א. atrial septal defect או ventricular septal defect או patent ductus arteriosus שלא נותח בתקופה של דחית שירות לשנתיים או אחרי ניתוח לא מוצלח או עם הפרעות המודינמיות ללא סיכויים להטבה.

- ב. (1) aortic aneurysme.
(2) כל מום לב מולד או נרכש עם סימנים להגדלת חדרי הלב עם אי-ספיקה או סיפור של אי-ספיקה או סיכונים אחרים.
(3) כל מום לב שלווה בזריקת תסחיפים או איבוד הכרה או הפרעות קצב חדריות ניכרות.
(4) כל מום מסתמי לאחר החלפת מסתם ע"י פרוטזה או לאחר commissurotomy.
(5) aortic stenosis עם שינויים בא. ק. ג.
(6) מומי לב משולבים (שניים או יותר).

ג. bacterial endocarditis בעבר עם מימצאים בקטריולוגיים חיוביים או עם מום לב.
ד. מחלות שריר הלב ראשוניות ומשניות עם סימנים קליניים, אלקטרוקרדיו-גרפיים ורנטגניים ניכרים. obstructive cardiomyopathy.
non obstructive cardiomyopathy עם תלונות קליניות או הגדלה משמעותית של צל הלב ו/או אריתמיה.

ה. coronary insufficiency עם הוכחה בא.ק.ג. או מצב אחרי myocardial infarction
ו. גוף זר בשריר הלב.

ז. (1) W.P.W. עם התקפי טכיקרדיה תכופים.

(2) טכיקרדיה פרוקסיסמלית עם התקפים תכופים.

(3) Adam's stokes syndrome

(4) II degree A-V block; trifascicular block; complete block

(5) אריתמיות על רקע אורגני.

ח. אי ספיקת הלב מכל סיבה.

ט. פריקרדיטיס שחפתית או מצב לאחר פריקרדיטיס שחפתית עם הפרעות בפעולת הלב או מחזור הדם. constrictive pericarditis

י. טכיקרדיה קבועה מעל 140 לדקה ללא סיבה מוגדרת ו/או תסמונת היפרקינטית עם הפרעות ניכרות בתפקוד היומיומי וללא שיפור המצב לאחר שנתיים.

11. יתר לחץ דם –

(1) יתר לחץ דם קבוע ללא טיפול מעל 175/100 או מעל 150/95 תוך טיפול ספציפי.

(2) כל יתר לחץ דם המצריך טיפול ספציפי עד גיל 25.

(3) כל יתר לחץ דם עם סימני הגדלת לב ו/או שינויים בקרקעית העיניים.

12. מחלות כלי דם היקפיים –

- א. post phlebitic leg עם בצקת קשה ו/או שינויים טרופיים ו/או כיבים שאינם מתרפאים.
- ב. thrombophlebitis migrans ללא ריפוי מעל שנה.
- ג. אי ספיקה ורידית כרונית המלווה שינויים טרופיים קשים בעור, פיגמנטציה, בצקת וכיבים קשים שאינם ניתנים לריפוי.
- ד. מצב אחרי ניתוח הוורידים העמוקים של הרגל עם בצקת קשה קבועה ו/או כיבים שאינם מתרפאים. מצב אחרי קשירה או ניתוח של הווריד החלול התחתון.
- ה. מחלה סתימתית של העורקים ההיקפיים עם צליעה סירוגית, כאבים במנוחה או כיבים שלא מתרפאים לאחר טיפול ממושך או נמק.
- ו. מצב אחרי ניתוח עורק עם הפרעה תפקודית קשה, צליעה סירוגית מתקדמת, כאבים במנוחה או כיבים שאינם מתרפאים.
- ז. (1) נצור עורקי ורידי הקפי גדול עם הפרעות קשות במחזור הדם בגוף או עם הפרעה המודינמית כללית.
(2) מפרצת בעורק הקפי ראשי.
- ח. תופעות רינו בצורה קשה או עם שינויים טרופיים, כיבים או נמק, יותר מ-2 נתיים (לאחר התחלת הטיפול).
- ט. thoracic outlet syndrome עם או בלי צלע צווארית בצורה קשה עם נזק נוירי-לוגי קבוע או נמק כתוצאה מנזק עורקי.

13. מחלות הוושט, הקיבה והמעיים –

- א. (1) אכלזיה או סטריקטורה של הוושט עם תופעות קשות.
(2) בקע סרעפתי עם דימומים במשך 3 שנים ללא תיקון כירורגי.
- ב. (1) כיב קיבה או תריסריון עם התקפים תכופים מאד. מצב ירוד מאד.
(2) recurrent hematemesis or melena.
- ג. מצב לאחר פציעה או ניתוח של כיב הקיבה או התריסריון עם הפרעות עיכול קשות. מצב כללי ירוד או dumping syndrome בצורה ממושכת וקשה.
- ד. (1) celiac disease
(2) Crohn's disease
(3) Zollinger Ellison syndrome
(4) ליקויי ספיגה קבועים מוכוונים מעבדתית.
- ה. ulcerative colitis במצב קשה שאינה ניתנת לריפוי, או התקפים חוזרים.
- ו. (1) דיברטיקולוזיס עם הפרעות קשות.
(2) מחלת הירשפרונג עם עצירות עקשניות.
(3) פוליפוזיס עם הפרעות קשות שלא ניתנות לטיפול כירורגי.

- ז. מצב אחרי פציעה או ניתוח של המעי עם הפרעות קשות במערכת העיכול, ללא כל הטבה לאחר טיפול של שנה.
- ח. שחפת המעי הגס פעילה מעל שנתיים.

14. מחלות הכבד וכיס המרה —

- א. chronic active hepatitis מעל שנה.
- ב. דלקת חוזרת בדרכי המרה עם התקפים תכופים (עם או בלי צהבת) ללא הבראה לאחר שנתיים.
- ג. (1) אכינוקוקוס שאינו מסויד.
(2) אכינוקוקוס עם הוראה לניתוח, שלא נותח מעל לשנה.
(3) אכינוקוקוס עם מספר ציסטות.
- ד. מחלה (למעט דלקת נגיפית), פציעה או ניתוח של הכבד או כיס המרה עם סימני זיהום חוזרים.
- ה. (1) שחמת כבד ומחלות מקורבות.
(2) מצב לאחר ניתוח דלף פורטוסיסטמי.
- ו. chronic relapsing pancreatitis.

15. מחלות הטחול —

מחלות אגירה ומחלות רטיקולואנדותרליות לסוגיהן עם טחול מוגדל.

16. מחלות הצפק —

- א. ארועים חוזרים של ileus due to adhesions.
- ב. דלקת שחפתית של הצפק (peritonitis TB).

17. מחלות הכליות ודרכי השתן —

- א. צניחת כליות ptotic kidney או floating kidney או ectopic kidney עם סיבוכים ו/או פגיעה בתפקודי הכליות.
- ב. פיאלונפריטיס כרונית עם זיהומים תכופים ו/או פגיעה קבועה בתפקודי הכליה.
- ג. (1) chronic glomerulonephritis.
(2) ארועים חוזרים של תסמונת נפרוטית ללא החלמה או עם פגיעה בתפקודי כליות.
- ד. (1) הידרונפרוזיס הידרואורטר חד-צדדי, קשה, עם פגיעה בתפקודי הכליות ללא סיכויי החלמה, או דו-צדדי גם ללא הפרעה בתפקוד.
(2) polycystic kidney.
- ה. אבנים בגביע, אגן או שופכן חד-צדדי עם הפרעות קשות בפעולת הכליות ללא סיכוי להטבה ע"י טיפול.

- ו. מצב אחרי פגיעה או ניתוח ב-2 הכליות או ב-2 השופכנים עם פגיעה בפעולת הכליות ללא סיכויי הטבה ע"י טיפול.
- ז. state after nephrectomy, state after partial nephrectomy עם תפקודי כליות פגומים.
- ח. שחפת כליות ו/או דרכי השתן, פעילה מעל שנתיים או עם בוק כלייתי קבוע.

18. מחלות שלפוחית השתן הערמונית והשופכה –

- א. מחלות כרוניות בדרכי השתן לרבות שלפוחית, החזרות לעתים קרובות עם הפרעות קבועות בהטלת השתן או neurogenic bladder ללא סיכויים להטבה, רפלקס דו-צדדי עם הידרונפרוזיס או הידרואורטר.
- ב. אבנים בשלפוחית השתן עם הפרעות קשות ללא סיכוי הטבה ע"י טיפול.
- ג. epispadias או hypospadias עם הפרעות ניכרות.
- ד. vesico-vaginal fistula, vesico-rectal fistula
- ה. urethro-perineal fistula, urethro-rectal fistula
- ו. מחלת הערמונית או צוואר שלפוחית השתן או מצב אחרי ניתוח ערמונית עם הפרעות קשות בהטלת השתן, במשך יותר משנה, ללא סיכויי הטבה.
- ז. היצרות או ליקויים בשופכה המקשים על הטלת השתן במידה ניכרת עם סיבוכים שאינם ניתנים לריפוי.
- ח. אבני ערמונית עם הפרעות קשות בהטלת השתן ללא סיכויים להטבה ע"י טיפול.

19. מחלות מערכת העצבים המרכזית –

- א. מימצאים אוביקטיביים של נזק או ליקוי במערכת העצבים המרכזית, עם הגבלה קבועה וללא סיכויים לריפוי, כתוצאה ממחלה או חבלה בעבר ובהווה.
- ב. ליקוי צורת גולגולת מולד או נרכש, עם חוסר בעצם מעל 5 סמ"ר.
- ג. שיתוק עצב הפנים עם הפרעות קשות (פגיעה בקרנית), וללא הטבה לאחר טיפול וללא סיכויים להטבה.
- ד. נירלגיה קשה של עצב הפנים, ללא הטבה תוך טיפול תרופתי או אחר.
- ה. (1) מקרים של כפיון המקבלים טיפול מעל לשנתיים, ללא העלמות מוחלטת של ההתקפים על כל צורותיהם.
(2) כפיון עם שינויים בהתנהגות.

הפרעות אישיות ומחלות נפש

20. הפרעות אישיות –

- א. inadequate personality
- (1) הפרעות אישיות ללא סיכויים להטבה.
- (2) קב"א 42 ומטה עם הפרעות באישיות.

ב. schizoid personality עם קשיי הסתגלות חמורים.

ג. paranoid personality בכל חומרותיה.

21. פסיכוזות אנדוגניות —

פסיכוזות אנדוגניות על כל צורותיהן, גם לאחר התקף יחיד.

22. פסיכוזות אקסוגניות —

מצב אחרי פסיכוזה טוכסית או טראומתית או chronic brain syndrome עם שינויים באישיות.

23. נזירות —

נזירות ללא סיכויים להטבה, או severe chronic post traumatic neurosis.

24. התמכרות לסמים ואלכוהול —

א. סוציופטיה עם הפרעות בהתאמה חברתית.

ב. התמכרות לסמים או לאלכוהול או תולדות של שימוש קבוע בהם.

25. פיגור שכלי — mental retardation.

מחלות כירורגיות ואורטופדיות

26. צלקות —

(1) צלקות נרחבות ביותר.

(2) צלקות המחוברות לרקמות עמוקות המגבילות במידה קשה את האיברים.

(3) צלקות מכוערות ומעוררות רגש של גועל.

27. שאתות —

א. שאתות שפירות בעלות גודל ניכר, עם הפרעות מקומיות וכלליות בולטות שאינן ניתנות לגיתוח.

ב. שאתות ממאירות (פרט לגידולים מוגדרים בפרק מחלות עור ובפרק מחלות דם ולימפה).

28. שחפת העצמות והמפרקים —

א. שחפת עצמות פעילה מעל שנתיים.

ב. שחפת מפרק פעילה מעל שנתיים.

29. עמוד השדרה ובית החזה —

א. scoliosis ניכרת עם סימנים נזירולוגיים בולטים או הפרעה קשה בנשימה, או לאחר ניתוח לא מוצלח.

- ב. קיפוזיס ניכרת ללא סיכוי להטבה, במצב שאינו מאפשר תעסוקה בתנאים מוגנים; או קיפוזיס לאחר ניתוח לא מוצלח.
 - ג. כאבי גב עם סימנים קליניים או רנטגניים קשים במצב שאינו מאפשר תיפקוד, בלי סיכויים להטבה.
 - ד. spondylolisthesis עם סימנים נוירולוגים קבועים וסימנים קליניים קשים שאינם ניתנים לריפוי.
 - ה. מחלת Bechterew בכל צורתה.
 - ו. כל פגיעה בעמוד השדרה, עם מימצאים נוירולוגים, ללא סיכויים להטבה לאחר שנתיים מהאירוע.
 - ז. מצב לאחר ניתוח disc fusion או disc עם חסר נוירולוגי ניכר.
 - ח. בית החזה עם שינויי צורה ניכרים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח, עם הפרעות ניכרות בנשימה ו/או בפעולת הלב.
30. עצמות הגפיים העליונים –
- א. איבוד יד אחת או שתי ידיים.
 - ב. דלקת זיהומית כרונית של עצם או מפרק עם הפרעות קשות וללא סיכויים להטבה.
31. מפרקי הגפיים העליונים –
- א. בזק או מחלה במפרקים, עם הגבלה בתנועתיות היד בין 80% ל-100%.
 - ב. קשחת מפרק (כתף, מרפק או יד) בעמדה לא פיזיולוגית פונקציונלית.
 - ג. שינויים ניווניים (arthrosis osteoarthritis) במפרק גדול אחד או periarthritis או bursitis עם כאבים, עם הגבלה בתנועתיות המפרק מעל 50%.
32. שרירי הגפיים העליונים –
- פעילות קבוצתית של שרירים עם כח פחות מ-3 (= השריר פועל נגד ה-gravity) שאינם מאפשרים את השימוש בגף.
33. עצבי הגפיים העליונים –
- פגיעה שלמה בעצב גדול עם הפרעה תפקודית קשה של הגף ללא סיכויי הטבה.
34. אצבעות היד –
- א. חוסר ארבע אצבעות ביד אחת. חוסר שני אגודלים. חוסר כל האצבעות ביד הלא דומיננטית.
 - ב. קשחת בכל האצבעות בשתי הידיים (ללא חשיבות העמדה).
35. מחלות האגן –
- שינויי צורה מולדים או נרכשים, עם השפעה על איברי האגן או עם תווזו של ה-sacro iliac joint וצליעה, או שינויים במפרקים אחרים, ללא סיכויי הטבה.

36. עצמות הגפיים התחתונות —

- א. שינויים קשים במבנה או בציר העצם כתוצאה משבר או מחלה, עם הגבלה קשה בהליכה או הליכה תמידית בעזרת קביים, ללא סיכויי הטבה.
- ב. קיצור הגף מעל ל-7 ס"מ.
- ג. קטיעת גף תחתון אחד או קטיעת 2 הגפיים התחתונות.
- ד. (1) דלקת זיהומית כרונית בעצם או במפרק, הנמשכת מעל 3 שנים או עם סיכויים משניים סיסטמיים.
(2) מאורעות חוזרים של דלקת זיהומית בעצם או במפרק.

37. מפרקי הגפיים התחתונות —

- א. שינויים במפרק הירך עם הגבלת התנועות לכל הכיוונים מעל 25%, או בציר אחד מעל 50%, או osteoarthritis של מפרק הירך עם הגבלה בתנועות וכא-בים, ללא סיכויים להטבה.
- ב. קשיון של מפרק ירך אחד בעמדה לא פונקציונלית, או של שני מפרקים בלי סיכויי הטבה.
- ג. C.D.H. חד-צדדי או דו-צדדי מלא.
- ד. קשחת ברך אחת בעמדה לא פונקציונלית, או קשחת שתי הברכיים.
- ה. חוסר יציבות קשה במפרק הברך, אשר אינה מאפשרת הליכה בלי מכשיר.
- ו. רגליים "O", המרחק בין ה-med. condyles מ-20 ס"מ ומעלה, עם הפרעות קשות בהליכה.
- ז. רגליים "X", המרחק בין הקרסוליים מעל 15 ס"מ, עם הפרעות קשות בהליכה.
- ח. שינויים קבועים אחרי נזק או מחלה במפרק הקרסול, אשר אינם מאפשרים הליכה בלי מכשיר.

38. שרירי גפיים תחתונות —

- א. פגיעה בשרירים שאינה מאפשרת הליכה.
- ב. progressive muscular dystrophy מוכח ע"י בדיקות עזר (גנטית, אנזימתית, מיוגרפית).
- ג. myasthenia gravis.

39. עצבי גפיים תחתונות —

- א. פגיעה בעצב אחד עם חוסר תחושה, או פגיעה מוטורית חלקית עם חולשת שרירים פחות מ-3 (= השריר פועל נגד ה-gravity), בלי סיכויים להטבה.

40. כף הרגל —

- א. (1) מומים וליקויים מולדים קשים בכפות הרגליים, עם הגבלות ניכרות בהליכה.

(2) ליקויים נרכשים בכפות הרגליים, עם הפרעות קשות והליכה מוגבלת מאוד, ללא סיכוי להטבה.

ב. איבוד כף הרגל, או קטיעת כף הרגל בגובה ה־ tarsus.

41. אצבעות כף הרגל —

ליקויים או קשחת האצבעות, עם הפרעות קשות בהליכה, ללא סיכויים להטבה ע"י טיפול.

42. בקע —

בקע גדול בלתי מוחזר, שאינו ניתן לניתוח.

43. אשכים —

epididymitis TB פעילה מעל שנתיים.

44. פי הטבעת —

א. נצורים רבים של פי הטבעת, עם שינויים קשים ברקמה פריאנלית.

ב. (1) stricture of anus עם הפרעות קשות, הדורשות טיפול מתמיד.

(2) sphincter incontinence.

ג. קולוסטומיה או אילאוסטומיה קבועה.

ד. rectal prolapse צניחת החלחולת קשה, שלא ניתנת לטיפול כירורגי, או שחוזרת אחרי ניתוח.

מחלות האף

45. מחלות האף ומערות האף —

א. (1) rhinoscleroma.

(2) chronic purulent sinusitis שלא מגיבה לטיפול, יותר משנתיים.

ב. ozaena קשה ללא תגובה לטיפול.

מחלות הפה, הלסת והשיניים

46. פה ולשון —

חיך שסוע עם הפרעות קשות אשר אינו ניתן לתיקון או אחרי ניתוח לא מוצלח.

47. לסת —

אבדן קבוע של רציפות הלסתות; ליקויים קשים (מלידה) של הלסתות עם עיוותים אסתטיים או פונקציונליים קשים.

מחלות בית הבלעיה והגרון

48. א. הפרעות מלידה או נרכשות במבנה הלוע, עם הפרעות ניכרות באכילה. שאינן ניתנות לתיקון.

ב. גמגום קשה עם הפרעות ניפרות בהכעה.

ג. שיבושי היגוי חמורים, שאינם מאפשרים תקשורת ואינם ניתנים לריפוי, או ללא הטבה לאחר טיפול של שנה.

ד. מחלות הגרון והקנה, הגורמות להיצרות ולהפרעות כרוניות כנשימה ו/או אבדן קול, שאינם ניתנים לריפוי.

ליקוי שמיעה

49. שמיעה – לפי הטבלה:

ט ב ל ה

55 dB	50 dB	45 dB	40 dB	35 dB	25 dB	אוזן אחת
						אוזן שניה
						25 dB
						35 dB
						40 dB
בלתי כשר לשירות						45 dB
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות					50 dB
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות				55 dB

הטבלה ערוכה על פי תוצאות בדיקות S.R.T. לפי סטנדרט I.S.V.

במקרים בהם לא מבוצעת בדיקת S.R.T. או שאין התאמה בין תוצאותיה לממוצע בגלים 500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, יש להשתמש בממוצע התוצאות בטונים הנ"ל.

מחלות אוזניים

50. אפרכסת –

חוסר שתי אפרכסות.

51. אוזן תיכונה –

פיסטולה מאחורי האפרכסת, עם הפרשה רבה שלא ניתנת לתיקון..

52. שיווי משקל –

הפרעות קשות וכרוניות בשיווי משקל, הימצאות מימצאים אובקטיביים בבדיקה וסטיבולרית.

ליקויי ראייה

53. ראייה -

א. עיוורון של שתי העיניים.

ב. תיקון ראייה ע"י משקפיים: $\pm 4.5 D$ ראה בטבלה:

ט ב ל ה

6/60-0	6/36	6/24	6/12-6/18	6/7.5-6/9	6/6	עין אחת / עין שניה
						6/6
						6/7.5-6/9
בלתי כשר לשירות						6/12-6/18
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות					6/24
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות				6/36
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות			6/60-0

ג. תיקון ראייה ע"י משקפיים: מ' $\pm 4.75 D$ עד $\pm 8.75 D$ או עד 5 דיופטרים צילינדריות, ראה בטבלה:

ט ב ל ה

6/60-0	6/36	6/24	6/12-6/18	6/7.5-6/9	6/6	עין אחת / עין שניה
						6/6
						6/7.5-6/9
בלתי כשר לשירות						6/12-6/18
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות					6/24
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות				6/36
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות			6/60-0

ד. תיקון ראייה ע"י משקפיים: $\pm 9D$ יותר, או מעל 5 דיופטריות צילינדריות – ראה בטבלה:

ט ב ל ה

6/60-0	6/36	6/24	6/12-6/18	6/7.5-6/9	6/6	עין אחת עין שניה
						6/6
						6/7.5-6/9
בלתי כשר לשירות						6/18-6/18
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות					6/24
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות				6/36
בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות	בלתי כשר לשירות			6/60-0

54. חוסר עדשה –

חוסר עדשה בשתי העיניים, עם צורך בתיקון העולה על 5 דיופטריות צילינדריות.

55. דלקת הענבית –

דלקת הענבית עם התקפים חדים וחוזרים לעיתים קרובות.

56. רשתית ועצב הראייה –

א. היפרדות הרשתית, עם שינויים אנטומיים קבועים, לאחר טיפול ממושך, או היפרדות רשתית ו/או שינויים ניווניים קשים ברשתיות בשתי העיניים.

ב. עיוורון לילה מלא מלידה complete congenital night blindness.

ג. גלאוקומה שלא ניתנת לטיפול כירורגי ולא מאוזנת ע"י טיפול שמרני ו/או עם פגיעה בשדות הראייה.

ד. רטיניטיס פיגמנטוזה, עם הפרעות ניכרות בשדה הראייה ובראיית לילה.

57. פזילה –

strabismus paralyticus acquisitus עם ראייה כפולה, שאינו ניתן לריפוי.

58. צניחת העפעף –

פטוזיס מלאה בעין אחת, שלא ניתנת לתיקון כירורגי, ראייה בעין השניה פחות מ-6/9 עם או בלי תיקון.

59. מומי עמידת העיניים –

(1) lagophthalmus חד-צדדית, שלא ניתן לתיקון, הראייה בעין השניה פחות מ-6/9.

(2) lagophthalmus בשתי העיניים, שאינו ניתן לריפוי.

מחלות עור ומין

60. מחלות שנגרמו ע"י ליקויים בהתפתחות העור –

- א. epiloia.
- ב. לבקנות כללית (albinismus) עם הפרעות קשות.
- ג. alopecia totalis maligna.
- ד. epydermolysis bullosa hereditaria בצורה קשה, עם כושר הליכה מוגבל במידה ניכרת.
- ה. ichthyosis congenita המשתרעת על כל הגוף, עם הגבלות ניכרות בתנועה ובהליכה.
- ו. neurofibromatosis בצורה קשה, עם שינויים באיברים אחרים.
- ז. naevus pigmentosus; naevus pilaris על שטח נרחב, המעורר גועל.
- ח. naevus vascularis; naevus verrucosus על שטח נרחב, המעורר גועל.
- ט. tylosis בצורה קשה, עם הפרעות בהליכה או בתנועות הידיים.
- י. xeroderma pigmentosum.

61. מחלות עור ממקור פנימי –

- א. mycosis fungoides בכל צורותיה.
- ב. ulcer trophicum עם הפרעות ניכרות וללא הטבה לאחר טיפול במשך שנתיים.

62. הפרעות קונסטיטוציוניות –

- א. keloid acne המעוררת גועל.
- ב. גרב eozema כרונית חוזרת, עם הפרעות ניכרות או הגורמת לרגש של גועל, בלי סיכויים להטבה.
- ג. erythema nodosum חוזרת, יותר משנתיים.
- ד. granuloma annulare עם הפרעות קשות שנמשכת יותר משנתיים.
- ה. lichen ruber planus עם הפרעות ניכרות וגירוד חזק, מפוזרת בכל הגוף, יותר משנתיים.
- ו. L.E. discoides עם הפרעות ניכרות.
- ז. neurodermatitis בצורה קשה, המשתרעת על הזרועות והשוקיים, עם גירוד ניכר יותר משנתיים.
- ח. pompholyx בצורה קשה וכן גרד prurigo, pruritus בצורה כרונית קשה, עם הפרעות ניכרות.
- ט. (1) psoriasis vulgaris המשתרעת על כל הגוף.
- (2) psoriatic arthritis עם שינויים במפרקים ו/או הגבלה תפקודית קשה.
- י. seborrheic dermatitis בצורה קשה, עם התלקחויות תכופות והפרעות כלליות ניכרות.

- יא. chronic urticaria קשה, ו/או התקפים חוזרים של angioneurotic edema.
- יב. progressive systemic sclerosis (scleroderma).
- יג. בהרת vitiligo על שטח נרחב, המעוררת גועל.
- טו. urticaria pigmentosa עם שינויים סיסטמיים.
- טז. pemphigus vulgaris ככל צורותיה.
- יז. dermatitis herpetiformis התקפים חוזרים.
- יח. erythema multiforme בצורה חוזרת קשה, או Steven Johnson disease יותר משנתיים.

63. מחלות הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים —

- א. contact dermatitis כרונית עם הפרעות ניכרות, שלא מגיבה לטיפול במשך שנתיים.
- ב. (1) dermatitis actinica בצורה קשה, עם סכנה לסיבוכים.
(2) porphyria hydropica aestivale.

64. מחלות הנגרמות ע"י זיהום —

- א. (1) actinomycosis שלא התרפא במשך 3 שנים.
(2) blastomycosis.
- ב. (1) acrodermatitis chronica persistens.
(2) acrodermatitis continua (Hallopeau's disease).
- ג. active lepra או inactive lepra עם נזקים במפרקים ו/או בעצבים.
- ד. erysipelas recidivans עם הפרעות מקומיות ניכרות.
- ה. furunculosis כרונית קשה, הנמשכת יותר מ-3 שנים וללא סיכוי הטבה.
- ו. leishmaniasis כרונית חוזרת, המעוררת גועל, עם הפרעות ניכרות.
- ז. (1) erythema induratum Bazini.
(2) שחפת עור פעילה יותר משנתיים.

65. שאתות העור —

- א. carcinoma cutis שאינו ניתן לריפוי, או עם גירויים או התפשטות מעבר לעור.
- ב. malignant melanoma.

66. מחלות נספחי העור —

- א. keratosis follicularis בצורה קשה.
- ב. pityriasis rubra pilaris בצורה קשה.
- ג. onychogryphosis עם קשיי הליכה ניכרים ללא סיכויים להטבה.

67. מחלות מין –

- א. עגבת עם סיבוכים או נזקים קבועים, נזירולוגיים, קרדיוסקולריים ו/או סיס-
טמיים אחרים, או syphiloderma.
- ב. lymphogranuloma inguinale עם צלקות קשות והפרעות במערכת הלימפה.

מחלות נשים

68. הפרעות וסת –

- (1) הפרעה גנטית או אנדוקרינית באיברי המין הכרוכה בהפרעות נפשיות.
- (2) dysfunctional bleeding לעתים קרובות, עם אנמיה, לאחר כישלון של
טיפול הורמונלי מתאים במשך שנתיים.

69. דלקת איברי המין של האשה –

- דלקת כרונית של איברי המין הפנימיים, עם הפרעות ניכרות, שאינן ניתנות
לריפוי או שלא התרפאו תוך שנתיים.

70. שאתות לא ממאירות של איברי המין של האשה –

- שאתות לא ממאירות של איברי המין הפנימיים או החיצוניים, עם הפרעות
כרוניות, הדורשות טיפול ממושך.

71. צניחת הרחם –

- א. צניחת הרחם או הווגינה, עם הפרעות ניכרות וללא הטבה לאחר טיפול.
- ב. fistula vesicovaginalis מכל צורה.
- ג. fistula rectogenitalis מכל צורה.

מצב לאחר מחלות חדות ותסמונות בלתי מוגדרות

72. תשישות כללית, מחלות ותסמונות לא מוגדרות –

- מחלות בעלות אופי כרוני או תסמונות לא מוגדרות, שאינן מאפשרות שירות,
ללא סיכויים להטבה.

תוספת שניה

(תקנה 6)

מבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשר ארעית לשירות

נבדק שיש בו אחד המבחנים המפורטים להלן אך אין בו אחד המבחנים הקבועים בתוספת הראשונה, יהיה בלתי כשיר ארעית לשירות לתקופה שתקבע על-ידי הועדה הרפואית, אולם רק תקופות זמן הקבועות לצדו של כל מבחן שלהלן לא תבואנה במנין התקופות להתייצבות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לסעיף 15 לחוק.

מבנה הגוף

1. גברים:

גובה 1.36 – 1.40 מ' אצל בני עד 20 שנה.

נשים:

גובה 1.31 – 1.35 מ' עם הוכחה רנטגנית לאפיפיוזות פתוחות ביד.

עד שנתיים.

שנה

2. משקל מתחת למינימלי עד גיל 21 כאמור בטבלה שלהלן.

שנה

3. משקל מעל למכסימלי עד גיל 21 כאמור בטבלה שלהלן.

ט ב ל ה

משקל מכסימלי (ק"ג)	משקל מינימלי (ק"ג)	גובה (מ')
70	36	140
75	37	145
80	38	150
86	39	155
92	41	160
98	43	165
104	45	170
110	48	175
116	52	180
122	56	185
128	59	190
134	61	195
140	65	200

הערות: (1) לגבי נבדקים שריריים במיוחד – יש להעלות את המשקל המקסימלי ב-10%.

(2) מעל גובה 2 מ' – לבדיקה אצל רופא מומחה.

מחלות פנימיות ואורולוגיות

4. מחלות של קשריות וכלי לימפה —

- | | |
|---|--|
| <p>א. לימפאדנופטיה ניכרת המחייבת בירור רפואי ממושך.
 ב. TB lymphadenopathy.
 (1) עם סימני פעילות עד שנתיים מתחילת המחלה.
 (2) מצב עם 4 שנים לאחר ריפוי.
 ג. מצב לאחר ניתוח לתיקון לימפאדמה עד שנתיים לאחר הניתוח.</p> | <p>התקופה
 עד 6 חדשים.
 עד שנתיים.
 עד שנתיים.
 עד שנתיים.</p> |
|---|--|

5. מחלות של בלוטות הפרשה פנימיות —

- | | |
|--|--|
| <p>א. זפק עם הפרעות ניכרות או סימני לחץ על דרכי הנשימה הניתן לריפוי.
 ב. פעילות יתר של בלוטת התריס עם הפרעות ניכרות הניתנות לריפוי.
 ג. תת פעילות של בלוטת התריס עם סימפטומטולוגיה קלינית קשה הניתנת לריפוי.
 ד. acromegalia בצורה קלה עד 5 שנים לאחר הריפוי או גמר הטיפול.
 ה. (1) פעילות יתר של הטוחה (hyperadrenalism) עם הפרעות הניתנות לריפוי.
 (2) Cushing's syndrome בטיפול ועד שנתיים לאחר הטיפול.
 (3) hyperaldosteronism בטיפול.
 (4) adrenogenital syndrome עם הפרעות הניתנות לטיפול.
 ו. diabetes insipidus בשלבי בירור.
 ז. hypoadrenalism עם הפרעות ניכרות הניתנות לריפוי.
 ח. (1) hyperparathyroidism לפני טיפול או עד שנה לאחר טיפול.
 (2) hyperparathyroidism בשלבי בירור.
 ט. היפוגונדיזם עם הפרעות קשות הניתנות לריפוי.</p> | <p>שנה.
 עד שנתיים.
 עד שנה.
 שנתיים.
 עד שנתיים.
 עד שנתיים.
 עד שנתיים.
 עד 6 חדשים.
 שנה.
 עד שנה.
 עד שנה.
 שנה.</p> |
|--|--|

6. סכרת —

סכרת שהתגלתה אחרי גיל 26 והזקוקה לאיזון.

7. מחלות השיגרון, שיגרון ומחלות קולגניות —

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <p>א. active rheumatic fever התקף ראשון או חוזר. דחיה עד שתעבורנה 3 שנים לאחר ההתקף האחרון.
 ב. F.M.F. עם התקפים תכופים.</p> | <p>עד שנתיים.
 שנה.</p> |
|--|-------------------------------------|

8. מחלות דם —

- | | |
|--|-------------------|
| <p>א. פגם מולד בכדוריות האדומות הניתן לתיקון ע"י כריתת הטחול. דחיה עד שנתיים לאחר ניתוח.</p> | <p>עד שנתיים.</p> |
|--|-------------------|

- ב. תמס דם נרכש מגורם לא ידוע עם סיכוי להבראה.
ג. חוסר דם אפלסטי או סידרובלסטי עם סיכוי להבראה.
ד. חוסר דם ביכר על רקע מצבי חוסר, הנמצא בטיפול.
ה. (1) פרופורה טרומבוציטופנית כרונית בזמן טיפול.
(2) פרופורה טרומבוציטופנית חריפה.
ו. אגרנולוציטוזיס עם סיכוי להבראה. דחיה עד לחצי שנה מהארוע.
ז. פוליציטמיה ורה עם סיכוי להטבה.

9. מחלות הסימפונות והריאות —
א. התקפים תכופים וקשים של אסטמה או status asthmaticus.
ב. ברונכיאקטוזות באונה אחת עם גניחות דם ו/או פליטת כיח מסיבי עם אפשרות לניתוח. דחיה עד שנה לאחר הניתוח.
ג. אכינקוקוס בריאה אחת שניתן לריפוי על ידי ניתוח. דחיה לתקופה המשלימה עד שנתיים לאחר הניתוח או עד שלוש שנים לאחר הגילוי ללא ניתוח.
ד. גוף או גופים זרים עם הפרעות (שיעול, גניחות דם, זיהומים חוזרים) עם אפשרות לריפוי.
ה. מצב לאחר מחלה, פציעה או ניתוח בריאה שטרם הגיעה להחלמה שלמה.
ו. ציסטות בריאות בשלבי בירור וניתנות לטיפול.
ז. (1) שחפת ריאות עם סימני פעילות ברורים, עד שנתיים מתחילת הפעילות.
(2) מצב אחרי שחפת פעילה בריאות עד 4 שנים אחרי ריפוי.
ח. (1) דלקת שחפתית בקרום הריאה, אשר טרם חלפו 4 שנים מהריפוי.
(2) שחפת פעילה של קרום הריאה.
ט. (1) spontaneous pneumothorax בממדים רציניים הנוקק לטיפול פעיל.
(2) מחלות חדות לא שחפתיות של קרום הריאה.

10. מחלות ומומי לב —
א. ventricular septal defect גדול (קלינית) או atrial septal defect גדול (קלינית) או patent ductus arteriosus גדול (קלינית) עם סיכויים להטבה אחרי ניתוח. דחיה עד שנתיים לפני הניתוח ועד שנתיים לאחר הניתוח.
ב. pulmonic stenosis קשה (מפל לחץ מעל 75 מ"מ) עם סיכויים להטבה. דחיה לשנתיים לפני הניתוח ועד שנתיים אחרי הניתוח.

- ג. אבחנה קלינית של S.B.E. בעבר ללא מימצאים בקטריוLOGיים או ללא מום לב, עד 3 שנים לאחר המחלה ובמצב כללי טוב. עד שנתיים.
- ד. מחלות שריר הלב או דלקת שריר הלב עם מימצאים אלקטרוקארדיוגרפיים או מעבדתיים. דחיה עד שנה לאחר ההחלמה. עד שנה.
- ה. דלקת כפורת הלב לא שחפתית עד שנה לאחר הריפוי. עד שנה.
- ו. טכיקרדיה קבועה מעל 140 לדקה ללא סיבה מוגדרת ו/או תסמונת היפרקינז טית עם הפרעות ניכרות בתפקוד יומיומי. עד שנתיים.
11. מחלות כלי דם הקפיים —
- א. דלקת חריפה של הוורידים העמוקים או כיב על רקע של אי ספיקה כרונית. עד שנה.
- ב. thrombophlebitis migrans עד שנה לאחר הריפוי. שנה.
- ג. מצב לאחר תיקון כירורגי של דליות varicose veins syndrome עם סיבוכים לאחר ניתוח. עד שנה.
- ד. מצב אחרי ניתוח בוורידים העמוקים של הרגל עקב מחלה או חבלה. עד שנה.
- ה. (1) מצב לאחר ניתוח עורק הקפי. עד שנה לאחר הניתוח. עד שנה.
- (2) מצב לאחר ניתוח עורקי בעקבות חבלה עד חצי שנה לאחר הניתוח. עד 6 חדשים.
- ו. מצב לאחר תיקון של מפרצת מדומה או נצור עורקי ורידי, עד שנה לאחר הניתוח. עד שנה.
- ז. תופעות רינו בצורה קשה ולעיתים קרובות. עד שנתיים.
- ח. (1) thoracic outlet syndrome עד חצי שנה לאחר הניתוח. עד 6 חדשים.
- (2) צלע צווארית עם הפרעות ניכרות וסיכויי הטבה אחרי הניתוח. עד 6 חדשים.
12. מחלות הוושט, הקיבה והמעיים —
- א. (1) אכלזיה או סטריקטורה של הוושט, עד שנתיים אחרי הרחבה מוצלחת או ניתוח מוצלח. עד שנתיים.
- (2) בקע סרעפתי עם דימום. דחיה עד 3 שנים. עד שנתיים.
- ב. (1) כיב קיבה או תריסריון במצב תזונתי ירוד מאד. שנתיים.
- (2) כל מחלה של קיבה או תריסריון הגורמת לדמם. דחיה עד שנתיים לאחר הדימום. עד שנתיים.
- ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח של הקיבה או התריסריון או dumping syndrome. עד שנתיים.
- ד. שלשול מכל סיבה, רצוף או לסירוגין המלווה סטיאטוריה או ירידה ניכרת במשקל. עד שנה.
- ה. ulcerative colitis חריפה עם סיכויי הכראה טובים. עד שנתיים.
- ו. (1) מחלת הירשפרונג (Hirschprung's disease) עד שנה לאחר ניתוח מוצלח. עד שנה.
- (2) מצב לאחר כריתת פוליפים במעי. עד שנה.

עד 6 חדשים.

ז. מצב אחרי פציעה או ניתוח של המעי, עד חצי שנה לאחר ניתוח.

ח. שחפת מעי גם TB of colon

שנתיים.

(1) פעילה עד שנתיים.

שנתיים.

(2) לאחר ריפוי, עד 4 שנים.

13. מחלות הכבד וכיס המרה —

עד שנה.

א. chronic active hepatitis עד שנה מתחילת המחלה.

עד שנה.

ב. אבנים בכיס המרה או בצינור המרה המשותף עם כאבים תכופים, דלקת או צהבת.

עד שנה.

ג. אכינוקוקוס עם הוראה לניתוח או עד שנה לאחר הניתוח.

עד שנה.

ד. מחלה (למעט דלקת נגיפית), פציעה או ניתוח של הכבד או כיס המרה. דחיה עד שנה לאחר הארוע.

עד שנה.

ה. התקף של פנקריאטיטיס (למעט חזרת) וללא מחלת דרכי המרה. דחיה עד שנה לאחר הניתוח.

14. מחלות הטחול —

מצב לאחר כריתת הטחול

עד 6 חדשים.

(1) עקב חבלה — עד 6 חדשים מאז הניתוח.

עד שנתיים.

(2) עקב מחלה המטולוגית — עד שנתיים מאז הניתוח.

15. הידבקויות הצפוק —

שנה.

חסימת מעיים שלמה או חלקית כתוצאה מהידבקויות לאחר ניתוח בטן (ileus due to post operative adhesions) חולפת לאחר טיפול כירורגי או שמרני.

16. מחלות הכליות ודרכי השתן —

עד שנה.

א. (1) מצב עד שנה לאחר ניתוח כליות בגלל אנומליות.

שנה.

(2) מצב של אנומליה בכליות המחייב טיפול ניתוחי.

שנה.

ב. פילונפריטיס כרונית עם התלקחויות.

שנתיים.

ג. (1) acute glomerulonephritis

שנתיים.

(2) nephrotic syndrome מסיבה כלשהי.

עד שנתיים.

(3) acute renal failure עם סיכויים להטבה.

שנה.

ד. הידרונפרוזיס הידרואורטר בצורה קשה, בצד אחד, עם סיכויים להטבה אחרי טיפול.

שנה.

ה. אבנים בגביעים באגן או בשופכן עם הפרעות קשות אולם עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.

- ו. מצב אחרי פציעה, nephrotomy או תיקון פלסטי באגן הכליה או השופכן, עד שנה לאחר הניתוח.
 - ז. תיפקודי כליות תקינים, st. after nephrectomy, st. after partial nephrectomy. דחיה עד שנה לאחר הניתוח.
17. מחלות שלפוחית השתן, הערמונית והשופכה —
- א. (1) מחלות כרוניות בדרכי השתן או השלפוחית neurogenic bladder עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.
 - (2) reflux עם הוראה לניתוח.
 - ב. (1) אבנים בשלפוחית השתן עם הפרעות ועם סיכוי הטבה ע"י טיפול.
 - (2) מצב אחרי ניתוח הוצאת אבנים, עד שנה לאחר הניתוח.
 - ג. ניתוח של אפיספדיאס או היפוספדיאס, עד שנה לאחר הניתוח.
 - ד. (1) מחלות הערמונית או צוואר השלפוחית עם הפרעות קשות, שניתנות לטיפול כירורגי.
 - (2) מצב אחרי ניתוח הערמונית או בצוואר השלפוחית עם סיכויי הבראה.
 - ה. היצרות או ליקויים בשופכה המקשים על הטלת השתן במידה ניכרת וסיכור-כים הניתנים לריפוי.
 - ו. אבני ערמונית עם הפרעות קשות בהטלת השתן עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.
18. מחלות מערכת העצבים המרכזית —
- א. נזקים, ליקויים, מחלות או מצבים אחרי מחלה, או חבלה קשה במערכת העצבים המרכזית עם תלונות סוביקטיביות ניכרות ו/או מימצאים אובייק-טיביים מגבילים; עם סיכויים להטבה.
 - ב. שיתוק עצב הפנים במצב כרוני, עם הפרעות קשות ועם סיכויים להטבה.
 - ג. (1) התקפי מיגרנה קשים ומובהקים.
 - (2) נזירלגיה קשה של העצב החמישי, הדורשת בירור.
 - ד. התקפים של כפיזון על כל צורותיו פחות משנתיים לאחר ההתקף, תוך כדי טיפול או ללא טיפול.
- הפרעות אישיות ומחלות נפש
19. הפרעות אישיות — immature personality and neurotic personality. עם קשיי התאמה חמורים וסיכויים להטבה.
20. פסיכוזות אקסוגניות —
- פסיכוזה טוכסית או טראומטית או acute brain syndrome עם סיכויים להטבה בזמן ההתקף ועד שנתיים אחריו.

עד שנתיים.

- א. נוירוז המגבילה פעילות בתחומים רבים, עם סיכויי הטבה לאחר טיפול.
 - ב. gross transient situational maladjustment.
 - ג. combat reaction עם הגבלה ניכרת במרבית התחומים וסיכויים להטבה.
- עד שנתיים.
עד 6 חדשים.
עד שנתיים.

מחלות כירורגיות ואורטופדיות

22. צלקות –

- צלקות נרחבות עם נטיה להתמגלות, או עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.

6 חדשים.

23. שאתות –

- שאתות שפירות בעלות גודל ניכר, עם הפרעות מקומיות וכלליות בולטות, הניתנות לטיפול כירורגי.

שנה.

24. שחפת העצמות והמפרקים –

- א. (1) שחפת עצמות פעילה עד שנתיים.
 - (2) מצב אחרי שחפת עצמות עד 4 שנים לאחר הריפוי.
 - ב. (1) שחפת מפרק פעילה עד שנתיים.
 - (2) מצב עד 4 שנים לאחר הריפוי.
- שנתיים.
שנתיים.
שנתיים.
שנתיים.

25. עמוד השדרה ובית החזה –

- א. scoliosis מתקדמת, הדורשת טיפול, דחיה לשנתיים ו/או עד שנתיים לאחר הניתוח.
 - ב. קיפוזיס במצב אחרי ניתוח, עם מחוך פנימי.
 - ג. כאבי גב קשים עם סימנים קליניים ורנטגניים ניכרים במצב שלא מאפשר תיפקוד אך עם סיכויים להטבה.
 - ד. spondylolisthesis עם סימנים קליניים ניכרים, דחיה לשנה ועד שנה לאחר הניתוח.
 - ה. כל פגיעה בעמוד השדרה, עם מימצאים נוירולוגיים ו/או פגיעה המחייבת שימוש באמצעים אורטופדיים, עם סיכוי להטבה.
 - ו. מצב לאחר ניתוח fusion או disc עד 6 חדשים מהניתוח.
 - ז. חבלות בבית החזה הדורשות טיפול ממושך, עם סיכויי הטבה.
- עד שנתיים.
שנתיים.
עד שנה.
עד שנה.
עד שנתיים.
עד 6 חדשים.
עד שנתיים.

26. עצמות הגפיים העליונים –

- א. שבר או מחלה בעצמות הגפיים, הדורשים תיקון ממושך.
 - ב. דלקת זיהומית חריפה או כרונית של עצם או מפרק עם סיכויים להטבה.
- עד שנה.
שנה.

27. מפרקי הגפיים העליונים –
 - א. מצב לאחר ניתוח של פריקה חוזרת של הכתף, עד שנה לאחר הניתוח.
 - ב. נזק או מחלה במפרקים, המצריכים טיפול ממושך עם סיכויים להטבה.
28. שרירי הגפיים העליונים –
 - שינויים בשרירים, הדורשים טיפול ממושך והניתנים לריפוי.
29. עצבי הגפיים העליונים –
 - נזק או מחלת עצבי הגף הדורשים טיפול ממושך עם סיכויים להטבה.
30. אצבעות היד –
 - קשחת שביתן לתקנה ע"י ניתוח.
31. מחלות האגן –
 - שבר או מחלות האגן, הדורשים טיפול ממושך עם סיכויים להטבה.
32. עצמות הגפיים התחתונים –
 - א. שבר או מחלות העצמות, הדורשים טיפול ממושך, עם סיכויים טובים להכרעה.
 - ב. (1) דלקת זיהומית חריפה או כרונית בעצם או במפרק, דחיה עד 3 שנים.
(2) מצב אחרי ריפוי של דלקת זיהומית בעצם או במפרק, עד שנה לאחר הריפוי.
33. מפרקי הגפיים התחתונים –
 - א. נזק או מחלה במפרק הירך הדורשים טיפול ממושך, עם סיכויים להטבה.
 - ב. שינויים קשים במפרק הירך, הניתנים לטיפול ע"י ניתוח.
 - ג. נזק או מחלה במפרק הברך, הדורשים טיפול ממושך, עם סיכויים להטבה.
 - ד. קרע של רצועות הברך, עם אי יציבות ניכרת, הניתן לתיקון ע"י ניתוח.
 - ה. נזק או מחלה במפרק הקרסול, הדורשים טיפול ממושך עם סיכויים להטבה.
34. שרירי הגפיים התחתונים –
 - א. שינויים בשרירים, הניתנים לתיקון כירורגי.
 - ב. חשד קליני ל- progressive muscular dystrophy, חולשה בשרירים פרוקסימליים שלא על רקע טראומתי.
35. עצבי הגפיים התחתונים –
 - נזקים או מחלות של עצבי הגף, הדורשים טיפול ממושך עם סיכויים להטבה.

36. כף הרגל –

- א. ליקויים קשים ביכרים בכף הרגל, הדורשים טיפול כירורגי, דחיה עד שנה אחרי ניתוח.
- ב. איבוד חלק כף הרגל עם transmetatarsal amputation.

עד שנה.
שנה.

37. אצבעות כף הרגל –

- א. איבוד אצבעות בכף הרגל, דחיה עד חצי שנה לאחר הבראת הגדם.
- ב. ליקויים או קשחת האצבעות, עם הפרעה ניכרת בהליכה, עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.

עד 6 חדשים
6 חדשים.

38. אשכים –

- א. וריקוצלה בגודל ניכר, עם סיכויים להטבה לאחר טיפול, דחיה חד-פעמית לחצי שנה ממועד הניתוח.
- ב. הידרוצלה בגודל ניכר, עם סיכויים להטבה אחרי טיפול, דחיה חד-פעמית ל-6 חדשים ממועד הניתוח.
- ג. מצב אחרי ניתוח בגלל אי ירידה באשכים, דחיה לחצי שנה ממועד הניתוח.
- ד. orchitis TB; epididymitis TB
- (1) פעילה עד שנתיים.
- (2) מצב עד 4 שנים לאחר הריפוי.

6 חדשים
6 חדשים.
6 חדשים.
שנתיים.
שנתיים.

39. פי הטבעת –

- א. fistula ani או pilonidal sinus עם סיכויים טובים להבראה, דחיה לחצי שנה ממועד הניתוח.
- ב. stricture of anus עם הפרעות קשות, הניתנות לטיפול כירורגי.
- ג. prolapse of rectal mucosa עם הפרעות קשות, הניתנות לטיפול כירורגי, דחיה עד חצי שנה ממועד הניתוח.
- ד. קולוסטומיה או אילאוסטומיה זמנית.
- ה. rectal prolapse צניחת החלחולת, מוחזרת בקושי וניתנת לטיפול כירורגי.

עד 6 חדשים.
6 חדשים.
עד 6 חדשים.
שנה.
6 חדשים.

מחלות אף

40. מחלות האף ומערות האף –

- א. chronic purulent sinusitis הדורשת טיפול, עם סיכויי הבראה.
- ב. ozaena צחנת האף עם סיכוי הטבה לאחר טיפול.

עד שנתיים.
שנה.

מחלות הפה הלסת והשיניים

41. פה ולשון –

- חיך שסוע ו/או שפה שסועה עם הפרעות ניכרות, הניתנות לטיפול כירורגי, דחיה לחצי שנה ממועד הניתוח.

עד 6 חדשים.

מחלות שאתיות שפירות או זיהומיות כרוניות או חדות של הלסת עם סיכויי הבראה.

עד שנה.

מחלות בית הבליעה והגרונ

43. א. הפרעות נרכשות במבנה הלוע עם הפרעות קשות ועם סיכויים להטבה. עד שנתיים.
 ב. שיבושי היגוי חמורים, שאינם מאפשרים הכנת הדיבור, הניתנים לטיפול. שנה.
 ג. מחלות הגרון והקנה, הגורמות להיצרות ולהפרעות בנשימה, הניתנות לתיקון. שנה.

מחלות אזניים

44. אוזן תיכונה —

דלקת כרונית של האוזן או פיטטולה מאחורי האפרכסת, עם סיכויי הטבה לאחר הניתוח.

שנה.

45. שיווי משקל —

מחלת Meniere עם מימצא שמיעתי וסטיכולרי מתאים, הפרעות ניכרות בשיווי משקל מכל סיבה אחרת, המופיעה לעיתים קרובות.

עד שנתיים.

מחלות עיניים

46. גרענת —

גרענת פעילה.

עד שנה.

47. דלקת הענבית —

דלקת חדה של הענבית (acute uveitis) דחיה עד שנה לאחר הריפוי.

עד שנה.

48. רשתית ועצב הראייה —

א. היפרדות הרשתית במחלות חדות של הרשתית, דחיה עד שנה לאחר גמר הטיפול.

עד שנה.

ב. מחלות חדות של עצב הראייה.

עד שנה.

ג. גלאוקומה הניתנת לגיתוח.

שנה.

49. פזילה —

strabismus paralyticus acquisitus הניתן לריפוי.

שנה.

50. מומי עמידת העיניים —

lagophthalmus הניתן לריפוי, עם סיכויים טובים.

עד 6 חדשים.

51. דרכי הדמעה —

סגירה כללית של דרכי הדמעה, עם דלקת מוגלתית.

עד 6 חדשים.

מחלות עור ומין

52. מחלות שנגרמו ע"י ליקויים בהתפתחות העור —
העדר שיער כללי alopecia totalis עם סיכויים טובים לריפוי.
התקופה
עד שנה.
53. מחלות עור ממקור פנימי —
ulcus trophicum עם הפרעות ניכרות, הניתן לטיפול.
שנה.
54. הפרעות קונסטיטוציוניות —
- dermatitis medicamentosa מקרים קשים הטעונים ברור וטיפול.
עד שנה.
 - eczema כרונית חוזרת, עם הפרעות ניכרות מקומיות וכלליות, הניתנות לטיפול וסיכויים להטבה.
עד 6 חדשים.
 - erythema nodosum מצב חד.
עד 6 חדשים.
 - granuloma anulare בצורה מפוזרת עם הפרעות קשות.
שנה.
 - lichen ruber planus עם הפרעות ניכרות וגירוד חזק, מפוזרת בכל הגוף.
שנה.
 - neurodermatitis בצורה קשה, המשתרעת על הזרועות והשוקיים, עם גירוד ניכר.
עד שנתיים.
 - psoriasis vulgaris המשתרעת על שטחים נרחבים, עם זיהום משני ו/או הפרעות קשות ללא שינויים במפרקים.
שנה.
 - seborrheic dermatitis בצורה קשה, עם הפרעות ניכרות וסיכויים לריפוי.
שנה.
 - chronic urticaria קשה מגורם ידוע, הניתנת לריפוי.
עד 6 חדשים.
 - dermatitis herpetiformis עם הפרעות קשות.
6 חדשים.
 - Steven Johnson disease עד שנתיים מתחילת המחלה.
עד שנתיים.
55. מחלות הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים —
contact dermatitis כרונית, עם הפרעות ניכרות, שלא מאפשרות תפקוד.
6 חדשים.
56. מחלות הנגרמות ע"י זיהום —
- actinomycosis דחיה לשנה, עד שלוש שנים.
שנה.
 - inactive lepra לאחר הפרעות במפרקים ובעצבים, עד 5 שנים מגמר הפעילות, דחיה עד 5 שנים.
עד שנתיים.
 - favus הדורש טיפול ממושך.
עד שנה.
 - furunculosis כרונית קשה, עם סיכויים להטבה ע"י טיפול.
6 חדשים.
 - leishmaniasis cutis בשלב פעיל, עם מוקדים מרובים, או leishmaniasis של עור הפנים, עם תסנינים עמוקים.
6 חדשים.
 - (1) שחפת עור פעילה עד שנתיים.
עד שנתיים.
 - (2) מצב אחרי ריפוי משחפת עור. עד שנה לפחות מגמר הטיפול והפסקת הפעילות.
שנה.

עד 6 חדשים

carcinoma cutis עד חצי שנה אחרי הריפוי.

58. מחלות מין —

6 חדשים

lymphogranuloma inguinale בזמן הטיפול, עם סיכויים לריפוי.

מחלות נשים

59. הפרעות וסת —

עד שנה.

dysfunctional bleeding לעיתים קרובות, עם אנמיה.

60. דלקת איברי המין של האשה —

עד שנתיים.

דלקות של איברי המין הפנימיים, עם הפרעות קשות, הדורשות טיפול ממושך.

61. שאתות לא ממאירות של איברי המין של האשה —

עד שנה.

שאתות לא ממאירות הניתנות לטיפול.

מצב לאחר מחלות חדות ותסמונות בלתי מוגדרות

62. תשישות כללית, מחלות ותסמונות לא מוגדרות —

עד שנה.

א. מצב של תשישות והחלמה לאחר מחלה או ניתוח, עם סיכויים טובים להבראה.

עד 6 חדשים.

ב. תסמונת או מחלה בשלבי בירור, שלא אובחנה סופית, עם הפרעות קשות.

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בטבת תש"ם (10 בינואר 1980).

עזר ויצמן
שר הבטחון

ד' בטבת תש"ם (24 בדצמבר 1979)
(חמ 1094-3)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).